

## Guillain barre

### Autor(res)

Oseraldo Vieira Rocha  
Viviana Jeruza Raimundo  
Anderson Nascimento Pinheiro  
Leticia Ap. De Oliveira Santos  
Jéssica De Jesus Barbosa

### Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

### Instituição

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA

### Resumo

O desenvolvimento de estudos que propiciam o conhecimento da caracterização de um grupo específico de pacientes acometidos por uma doença considerada rara, no qual sua etiologia exata ainda é uma incógnita, torna-se de extrema relevância uma vez que se constituem em instrumentos para o planejamento em saúde, bem como em subsídio aos profissionais de saúde a fim de prestar assistência de qualidade a esta clientela. O estudo possibilitou verificar que a maioria dos casos se concentraram em idades acima de 40 anos, sexo masculino, com sinais e sintomas prévios a internação como mialgia, cefaleia, febre, diarreia e disfagia relacionados a quadro infeccioso prévio. Os sinais clássicos da Síndrome de Guillain-Barré como a forma ascendente, simétrica e diminuição da força muscular surgiram de 4 a 9 dias antes da internação mantendo-se até a alta hospitalar.