CONSIDERAÇÕES DO TRANSTORNO DE DEFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE COM CRIANÇAS QUE FAZEM USO DE RITALINA

Autor(res)

Andréa Gonçalves De Almeida
Haiana Da Silva Mota

Categoria do Trabalho

3

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE BRASÍLIA

Resumo

É importante falar sobre o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) e o uso de medicamentos como o metilfenidato por várias razões.

Em primeiro lugar, o TDAH é uma condição médica comum que pode ter um impacto significativo no funcionamento diário da criança ou adolescente. Os sintomas de TDAH, como falta de atenção, hiperatividade e impulsividade, podem afetar a vida acadêmica, social e emocional da criança. Portanto, é importante entender a natureza do TDAH e as opções de tratamento disponíveis para ajudar a criança a alcançar seu potencial máximo.

Em segundo lugar, o uso de medicamentos, como o metilfenidato, é uma das opções de tratamento para o TDAH. Embora o metilfenidato possa ser eficaz no tratamento do TDAH em muitas crianças, também há preocupações em relação ao seu uso a longo prazo e aos possíveis efeitos colaterais. É importante saber os prós e contras do uso da medicação antes de iniciar o tratamento.

Em terceiro lugar, o uso de medicamentos para o tratamento do TDAH é frequentemente controverso e pode haver estigmas associados ao diagnóstico e tratamento da condição. Portanto, é importante educar a sociedade em geral sobre o TDAH e seu tratamento, para que as crianças com TDAH recebam o suporte necessário e sejam menos estigmatizadas.

Por fim, é importante falar sobre o TDAH e o uso de medicamentos como o metilfenidato para conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental em geral. O TDAH é apenas uma das muitas condições de saúde mental que afetam crianças e adultos e devem ser tratadas com a mesma seriedade que outras condições médicas.