HERPES

Autor(res)

Oseraldo Vieira Rocha
Larissa De Jesus Ramos Da Silva
Maria Cristina Ambrózio De Miranda Dos Santos
Silvana Santos Fagune
Hiago Augusto Da Silva Oliveira
Beatriz Letícia Dos Santos
Thainara Luz Da Silva

Categoria do Trabalho

1

Instituição

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE SÃO PAULO - OSASCO

Resumo

O herpes é uma infecção causada pelo Herpes simples vírus. O contato com o vírus acontece na infância, mas muitas vezes a doença não se manifesta nesta época. O vírus ultrapassa a pele e, entrando em um nervo, e se instala no organismo de forma inativa, até que venha a ser reativado. Na maior parte dos casos ele provoca infecções que afetam a pele, a cavidade oral, os lábios, os olhos e os órgãos genitais. Os sintomas iniciais começam com formigamento, coceira, ardor, vermelhidão e bolhas no lugar afetado, para depois se transformar em feridas. A herpes é contraída por indivíduos que são suscetíveis ao vírus, ou seja, que não possuem anticorpos para tal. Muitas vezes a herpes está associada a doenças sexualmente transmissíveis, mas existem dois tipos da doença (HSV-1 e HSV-2), e sua versão mais comumente transmitida é a 1, que se caracteriza pela transmissão na infância pelo compartilhamento de utensílios de uso pessoal. O HSV-2 é transmitido unicamente por contato sexual. O vírus da herpes não tem cura, e uma vez hospedado no organismo permanece incubado, vindo à tona sempre que a imunidade do indivíduo se encontra baixa.

A transmissão do herpes acontece pelo contato direto com a pele e com as mucosas de alguém infectado, como contatos íntimos, tipo o beijo ,sexo e o compartilhamento de objetos de uso pessoal como talheres, utensílios de cozinha, batons e toalhas, pois o vírus pode sobreviver por algumas horas fora do corpo humano. As localizações mais frequentes são os lábios e a região genital, porém o herpes pode aparecer em qualquer lugar da pele.

O herpes labial é uma infecção causada pelo vírus herpes simplex que provoca bolhas ou feridas na boca, geralmente na região dos lábios. As bolhas do herpes duram cerca de 10 dias e podem causar formigamento, dor e/ou coceira na região onde surgem.

O vírus varicela zoster, o mesmo que causa a catapora, Ao ser exposto ao vírus varicela pela primeira vez, fato que ocorre comumente durante a infância, o indivíduo desenvolve a catapora, doença caracterizada por febre e erupções avermelhadas na pele de todo o corpo. Aparecem bolhas, erupções cutâneas na face,vermelhidão,coceira mal-estar e sensação de queimação.

A herpes genital comum sexualmente transmissível caracterizada por dor e feridas genitais. Causada pelo vírus da herpes simples a doença pode afetar tanto homens como mulheres.Os sintomas são: dor, coceira e pequenas

feridas podem ocorrer no primeiro momento. Elas formam úlceras e crostas.