



4^a SEMANA DE CONHECIMENTO —



CANDIDÍASE FEMININA

Autor(es)

Carla Lino Cancian Utuari
Simone Silva Sousa
Fernanda Simplicio
Rosimeire Rodrigues Da Silva Costa
Maria Do Carmo Soares
Giseli Nunes Silva
Tatiana Elisabete Santos Gouveia
Valéria Silva Viana

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE OSASCO

Resumo

A candidíase vulvovaginal, portanto é uma doença causada por fungos do gênero Cândida, que são comensais da mucosa vaginal e digestiva. É uma doença muito comum, e estima-se que 75% das mulheres vão apresentar ao menos um episódio da doença ao longo da vida. Esse micro-organismo geralmente se aloja na pele, na boca (sapinho), no estômago, no intestino e na vagina. Os sintomas da infecção aparecem quando ocorrem alterações de imunidade do hospedeiro.

Geralmente, a candidíase está associada à queda da imunidade, ao uso de antibióticos, anticoncepcionais, imunossupressores e corticoides, à gravidez, diabetes, alergias e ao HPV (papiloma vírus). Apesar de não ser considerada uma infecção sexualmente transmissível, pode ser através de relações sexuais.