



## CANDIDÍASE FEMININA

### Autor(res)

Carla Lino Cancian Utuari  
Simone Silva Sousa  
Fernanda Simplicio  
Maria Do Carmo Soares  
Rosimeire Rodrigues Da Silva Costa  
Tatiana Elisabete Santos Gouveia  
Valéria Silva Viana  
Giseli Nunes Silva

### Categoria do Trabalho

1

### Instituição

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE OSASCO

### Resumo

A candidíase vulvovaginal, portanto é uma doença causada por fungos do gênero *Cândida*, que são comensais da mucosa vaginal e digestiva. É uma doença muito comum, e estima-se que 75% das mulheres vão apresentar ao menos um episódio da doença ao longo da vida. Esse micro-organismo geralmente se aloja na pele, na boca (sapinho), no estômago, no intestino e na vagina. Os sintomas da infecção aparecem quando ocorrem alterações de imunidade do hospedeiro.

Geralmente, a candidíase está associada à queda da imunidade, ao uso de antibióticos, anticoncepcionais, imunossupressores e corticoides, à gravidez, diabetes, alergias e ao HPV (papiloma vírus). Apesar de não ser considerada uma infecção sexualmente transmissível, pode ser através de relações sexuais.