Abordagem de afecções de caráter incidente em Divinópolis-MG e região em 2022 e 2023

Autor(res)

Thais Preisser Pontelo
Daniel Cunha Costa
Ytallo Junior Alve De Brito

Categoria do Trabalho

Iniciação Científica

Instituição

FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS

Introdução

As doenças leishmaniose visceral canina (LVC), giardíase e erliquiose por serem zoonoses tem alta relevância a saúde publica e vigilância epidemiológica, sendo as principais doenças que acometem Divinópolis-MG e região . Ambas as doenças acometem principalmente a raça canina e tendo tais animais como principal hospedeiro, aumentando assim a taxa de disseminação, visto que é a raça mais comum de animais de companhia no Brasil.
De maneira geral, foi abordado sobre as afecções mais frequentes, bem como técnicas de diagnóstico e tratamento mais encontrados durante a coleta e análise de dados de cada clínica em relação as doenças mais endêmicas.

Objetivo

O objetivo da pesquisa é fazer um levantamento de dados epidemiológicos e casuísticas, por meio de atendimentos veterinários nas clinicas da região, levando em consideração a frequência em que cada doença é apresentada ao profissional e o método com que esses atuam sobre tais enfermidades.

Material e Métodos

Com base nas coletas de dados das clinicas veterinárias Vet e Pet – Divinópolis/MG, PetZinho – Perdigão/MG e ProLife – Divinópolis/MG, foi feito um levantamento dos casos mais atendidos em ambas as clinicas. Dentre os dados coletados são englobado os principais sintomas, principais métodos de diagnostico e terapia aplicada em cada tratamento.
O levantamento dos dados citados foi feito nos anos de 2022 e 2023 sendo divididos em etapas de coleta, discussão, analise e apuração dos dados.

Resultados e Discussão

A LVC é uma afecção sendo os principais sinais clínicos observados nas fichas clínicas dos animais diagnosticados, alopecia, ressecamento nasal, secreção ocular, lesões multifocais na pele, anorexia e caquexia. O método de diagnóstico foi baseado em hemograma e teste ELISA.
Em relação a giardíase, dentre os principais sinais clínicos apresentados nos animais diagnosticados estão,

diarreia e vômito, inapetência, apatia e febre. Os principais exames utilizados foram hemograma completo e exame de fezes, e para o tratamento, 75% dos profissionais prescreveram o uso de metronidazol.
Se tratando da erliquiose canina os sinais clínicos mais apresentados foram anorexia, perda de peso, sendo o diagnostico final por meio do hemograma e o teste rápido para detecção de anticorpos igG e igM. (OLIVEIRA; et al, 2022). Entre os fármacos mais utilizados para tratamento, destaca-se a doxiclina, além da correção dos distúrbios secundários causados pela doença. (JERICO; et al., 2015.)

Conclusão

Em virtude dos dados analisados, a leishmaniose visceral canina (LVC), giardíase e erliquiose são as enfermidades mais encontradas e atendidas nos últimos meses nas clínicas veterinárias de Divinópolis-MG e região, sendo quase sempre padronizado o método de diagnostico e tratamento das doenças citadas.

Agência de Fomento

FUNADESP-Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular

Referências

JERICÓ, M.M; et al. Tratado interno de medicina veterinária de cães e gatos. Primeira edição. ed. Rio de Janeiro: Roca, 2015. 7047 p. ISBN 978-85-277-2666-5.

OLIVEIRA, A.A, BRAGA P.C.C, BALSAMO R,. EOLUÇÃO CLINICA DE ERLIQUIOSE EM CÃO- Relato de Caso. Anais do 24° Simpósio de TCC do Cento Universitário INCESP.2022(24);827832.