

TDAH E SUAS CARACTERÍSTICAS

Autor(res)

Marcos Paulo Andrade Bianchini
Gustavo Henrique Ferreira Lage
Alexandre Fonseca Monteiro De Castor
Thiago Ribeiro De Carvalho
Eduardo Augusto Gonçalves Dahas

Categoria do Trabalho

Iniciação Científica

Instituição

FACULDADE PITÁGORAS

Introdução

O transtorno de Déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido por sua sigla (TDAH). É um transtorno neurobiológico, de causas genéticas que aparecem na infância e na maioria dos casos, acompanha o indivíduo pela vida inteira, e é mais comum do que podemos imaginar. Seus sintomas são: Falta de atenção, inquietude e impulsividade, também é conhecido por DDA (Distúrbio do Déficit de atenção).

Este transtorno é reconhecido oficialmente por vários países e pela organização mundial da saúde (OMS). Em alguns países, como nos Estados Unidos, os portadores de TDAH são protegidos pela lei quanto a receberem tratamento diferenciado na escola e faculdade.

Objetivo

Pode-se dizer que algumas das causas, para o TDAH atingir uma criança é da próprias substâncias que a mãe pode estar ingerindo durante a gravidez, que podem causar alterações em algumas partes do cérebro do bebê. Pesquisas indicam que mães alcoolistas têm mais chance de terem filhos com problemas de hiperatividade e desatenção.

Material e Métodos

O material utilizado como acervo para esta pesquisa, baseiam-se no aumento inexplicável das vítimas deste transtorno a partir do ano de 2000 até o presente momento, hoje em dia, tal transtorno é mais comum do que podemos imaginar, e possui diversos métodos para tratamentos, como podemos ver: Psicoestimuladores, como Ritalina, é a principal escolha para o tratamento, Tioridazina ou Risperidona, por exemplo, são úteis apenas em casos específicos para controle do comportamento, especialmente quando há retardo mental e antidepressivos: Imipramina, Nortriptilina, Atomoxetina, Desipramina ou Bupropiona.

Resultados e Discussão

O TDAH é mais comum do que podemos imaginar, ele é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminhados para serviços especializados. Ele ocorre em 3 a 5% das crianças, em várias regiões diferentes do

II CONGRESSO NACIONAL DE PESQUISA JURÍDICA

OS DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE DEMOCRÁTICA



— 18 A 22 DE SETEMBRO DE 2023 —

mundo em que já foi pesquisado. Em mais da metade dos casos o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta, embora os sintomas de inquietude sejam mais brandos. Existe inclusive um Consenso Internacional publicado pelos mais renomados médicos e psicólogos de todo o mundo a este respeito. Consenso é uma publicação científica realizada após extensos debates entre pesquisadores de todo o mundo, incluindo aqueles que não pertencem a um mesmo grupo ou instituição e não compartilham necessariamente as mesmas idéias sobre todos os aspectos de um transtorno.

Conclusão

Podemos concluir, que o TDAH, é muito comum, e pode atingir qualquer pessoa, possui sinais silenciosos, mesmo sendo um transtorno comum entre as crianças e os adolescentes, exige cuidados e tratamentos, pois assim, ele pode aumentar a capacidade da vítima.

Referências

<https://tdah.org.br/sobre-tdah/o-que-e-tdah/>, apesar de ter feito pesquisas, tirei informações do meu caso, inclusive, minha mãe buscou tratamentos para mim e sempre estudou sobre.