TDAH E SUAS CARACTERISTICAS

Autor(res)

Marcos Paulo Andrade Bianchini
Gustavo Henrique Ferreira Lage
Thiago Ribeiro De Carvalho
Alexandre Fonseca Monteiro De Castor
Eduardo Augusto Gonçalves Dahas

Categoria do Trabalho

2

Instituição

FACULDADE PITÁGORAS

Introdução

O transtorno de Déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido por sua sigla (TDAH). É um transtorno neurobiológico, de causas genéticas que aparecem na infância e na maioria dos casos, acompanha o indivíduo pela vida inteira, e é mais comum do que podemos imaginar. Seus sintomas são: Falta de atenção, inquietude e impulsividade, também é conhecido por DDA (Distúrbio do Déficit de atenção.
Este transtorno é reconhecido oficialmente por vários países e pela organização mundial da saúde (OMS). Em alguns países, como nos Estados Unidos, os portadores de TDAH são protegidos pela lei quanto a receberem tratamento diferenciado na escola e faculdade.

Objetivo

Pode-se dizer que algumas das causas, para o TDAH atingir uma criança é da próprias substancias que a mãe pode estar ingerindo durante a gravidez, que podem causar alterações em algumas partes do cérebro do bebê. Pesquisas indicam que mães alcoolistas têm mais chance de terem filhos com problemas de hiperatividade e desatenção.

Material e Métodos

O material utilizado como acervo para esta pesquisa, baseiam-se no aumento inexplicável das vitimas deste transtorno a partir do ano de 2000 até o presente momento, hoje em dia, tal transtorno é mais comum do que podemos imaginar, e possui diversos métodos para tratamentos, como podemos ver: Psicoestimuladores, como Ritalina, é a principal escolha para o tratamento, Tioridazina ou Risperidona, por exemplo, são úteis apenas em casos específicos para controle do comportamento, especialmente quando há retardo mental e a ntidepressivos: Imipramina, Nortriptilina, Atomoxetina, Desipramina ou Bupropiona.

Resultados e Discussão

O TDAH é mais comum do que podemos imaginar, ele é o transtorno mais comum em crianças e adolescentes encaminhados para serviços especializados. Ele ocorre em 3 a 5% das crianças, em várias regiões diferentes do

mundo em que já foi pesquisado. Em mais da metade dos casos o transtorno acompanha o indivíduo na vida adulta, embora os sintomas de inquietude sejam mais brandos. Existe inclusive um Consenso Internacional publicado pelos mais renomados médicos e psicólogos de todo o mundo a este respeito. Consenso é uma publicação científica realizada após extensos debates entre pesquisadores de todo o mundo, incluindo aqueles que não pertencem a um mesmo grupo ou instituição e não compartilham necessariamente as mesmas idéias sobre todos os aspectos de um transtorno.

Conclusão

Podemos concluir, que o TDAH, é muito comum, e pode atingir qualquer pessoa, possui sinais silenciosos, mesmo sendo um transtorno comum entre as crianças e os adolescentes, exige cuidados e tratamentos, pois assim, ele pode aumentar a capacidade da vítima.

Referências

https://tdah.org.br/sobre-tdah/o-que-e-tdah/, apesar de ter feito pesquisas, tirei informações do meu caso, inclusive, minha mãe buscou tratamentos para mim e sempre estudou sobre.