

## TDAH: HIPERATIVIDADE E IMPULSÃO.

### Autor(es)

Flavia Thomazotti Claro  
Jonathan Lourenço  
Kaique Jesus De Assiz  
Michelle Cristina Marfil  
Wagner Daminelli Vianna

### Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

### Instituição

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO

### Resumo

O TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade) é um transtorno que afeta de 3% a 6% da população, principalmente crianças em idade escolar. Os sintomas incluem desatenção, hiperatividade e impulsividade. A avaliação clínica considera múltiplos sintomas, sua persistência em diferentes ambientes e o prejuízo clínico. O diagnóstico é clínico e leva em consideração critérios como o DSM-IV. Existem três tipos de TDAH: desatento, hiperativo/impulsivo e misto/combinado. O TDAH está relacionado a transtornos disruptivos do comportamento e pode levar ao abuso de drogas. A avaliação diagnóstica é desafiadora devido a discordâncias entre pais, crianças e professores. O tratamento envolve intervenções psicosociais e psicofarmacológicas, incluindo terapia individual e, em alguns casos, medicamentos estimulantes como o metilfenidato.

# 5ª SEMANA DE CONHECIMENTO

