Anhanguera

TDAH: HIPERATIVIDADE E IMPULSÃO.

Autor(res)

Flavia Thomazotti Claro
Jonathan Lourenço
Wagner Daminelli Vianna
Michelle Cristina Marfil
Kaique Jesus De Assiz

Categoria do Trabalho

1

Instituição

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO

Resumo

O TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade) é um transtorno que afeta de 3% a 6% da população, principalmente crianças em idade escolar. Os sintomas incluem desatenção, hiperatividade e impulsividade. A avaliação clínica considera múltiplos sintomas, sua persistência em diferentes ambientes e o prejuízo clínico. O diagnóstico é clínico e leva em consideração critérios como o DSM-IV. Existem três tipos de TDAH: desatento, hiperativo/impulsivo e misto/combinado. O TDAH está relacionado a transtornos disruptivos do comportamento e pode levar ao abuso de drogas. A avaliação diagnóstica é desafiadora devido a discordâncias entre pais, crianças e professores. O tratamento envolve intervenções psicossociais e psicofarmacológicas, incluindo terapia individual e, em alguns casos, medicamentos estimulantes como o metilfenidato.

5ª SEMANA DE CONHECIMENTO