

LESÃO POR PRESSÃO

Autor(res)

Marlene Gomes De Freitas
João Paulo De Jesus Gomes
Raimunda Nonata J Carneiro
Maria De Fátima Santos Tavares Silva
José Francisco Nunes Da Silva

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE OSASCO

Resumo

Lesão por pressão é um dano localizado na pele e/ou em tecidos mais profundos, podendo alcançar músculos e ossos. ocorre como resultado da pressão interna, geralmente sobre proeminências ósseas . Variam em gravidade: estágio 1, quando somente a pele está avermelhada ao estágio 4 com lesões profundas até músculos e ossos. As lesões podem ser vistas ainda em forma de bolha na pele, mancha roxa e depois de certo tempo, se o problema continuar, ficam escuras e formam crosta, conhecida como escara. Lembre-se que o sinal de vermelhidão na pele íntegra já indica o desenvolvimento da lesão. Este sinal pode ser difícil de visualizar em pessoas com a pele de tonalidade mais escura, porém ela pode ficar mais endurecida. Vários fatores podem causar lesão por pressão. O fator principal é a imobilidade da pessoa acamada ou em cadeira de rodas. Os dois juntos são as causas principais da lesão