Efeito da laserterapia no tratamento de lesões por pressão

Autor(res)

Marlene Gomes De Freitas
Bruna Freire Amorim Santos
Elma Dos Santos Ferreira
Alessandra Mesquita Alfredo
Sirley Rosa Alves Almeida Cpf
Sabrina Salvadora Bispo Figueiredo
Daiane Aparecida Coelho Das Dores
Luana Neves Domingues
Gleyce Kelly Carvalho Batista

Categoria do Trabalho

1

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA

Resumo

As Lesões por Pressão (LP) são danos que ocorrem na pele e/ou tecidos subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea, resultante de pressão de longa duração, como fricção, cisalhamento e umidade de longa duração. Quando prolongada interrompe a circulação do sangue, gerando uma ferida superficial ou profunda. A laserterapia é utilizada para diminuir processo inflamatório, cores articulares, musculares e para melhorar o processo de cicatrização. Com a exposição ao laser, as células danificadas são reparadas mais rapidamente. Tendo como resultado de pesquisa o uso de laserterapia tem mostrado ser um ótimo aliado no tratamento de lesões por pressão (LP), desde a primeira sessão, já se nota redução da dor e estimula a criação de novas células, com isso a cicatrização das feridas ocorrem mais rapidamente, com casos de cicatrização de 48 dias. Em relação aos artigos usados como base, tem o relato de uma enfermeira, com a assistência realizada corretamente, no período de dois meses obteve a cicatrização completa.

5ª SEMANA DE CONHECIMENTO