

Sífilis

Autor(es)

Clariana Lia Teixeira
José Augusto Silva Santos
Henderson Pedro Cruz Ferreira
Vitória Beatriz Santos Do Rosário

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA

Resumo

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Ela passa por quatro estágios: primário, secundário, latente e terciário. Os sintomas iniciais incluem feridas indolores, seguidas por erupções cutâneas. Se não tratada, pode causar complicações graves, afetando órgãos internos. O tratamento eficaz é feito com antibióticos, geralmente penicilina. A prevenção envolve o uso de preservativos e exames regulares. Os sintomas da sífilis variam nos diferentes estágios da doença:

1. *Estágio Primário:*

- Úlcera genital ou anal incolor chamada chancre.

5ª SEMANA DE CONHECIMENTO

2. *Estágio Secundário:*

- Erupções cutâneas, geralmente nas palmas das mãos e plantas dos pés.
- Febre, mal-estar, dor de garganta e gânglios linfáticos inchados.

3. *Estágio Latente:*

- Ausência de sintomas aparentes, mas a bactéria continua no corpo.

4. *Estágio Terciário:*

- Complicações graves, como danos aos órgãos internos, sistema nervoso, coração e vasos sanguíneos.

As causas são o contato sexual com uma pessoa infectada, transfusão de sangue contaminado, ou da mãe para o feto durante a gravidez. A bactéria *Treponema pallidum* é a responsável pela sífilis. O diagnóstico é feito por testes sanguíneos. O tratamento eficaz envolve antibióticos, geralmente penicilina. Prevenção inclui o uso de preservativos e exames regulares, especialmente em grupos de risco.

