

## Sífilis

### Autor(res)

Clariana Lia Teixeira  
José Augusto Silva Santos  
Henderson Pedro Cruz Ferreira  
Vitória Beatriz Santos Do Rosário

### Categoria do Trabalho

1

### Instituição

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA

### Resumo

A sífilis é uma doença sexualmente transmissível causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Ela passa por quatro estágios: primário, secundário, latente e terciário. Os sintomas iniciais incluem feridas indolores, seguidas por erupções cutâneas. Se não tratada, pode causar complicações graves, afetando órgãos internos. O tratamento eficaz é feito com antibióticos, geralmente penicilina. A prevenção envolve o uso de preservativos e exames regulares. Os sintomas da sífilis variam nos diferentes estágios da doença:

#### 1. \*Estágio Primário:\*

- Úlcera genital ou anal indolor chamada chancro.

#### 2. \*Estágio Secundário:\*

- Erupções cutâneas, geralmente nas palmas das mãos e plantas dos pés.  
- Febre, mal-estar, dor de garganta e gânglios linfáticos inchados.

#### 3. \*Estágio Latente:\*

- Ausência de sintomas aparentes, mas a bactéria continua no corpo.

#### 4. \*Estágio Terciário:\*

- Complicações graves, como danos aos órgãos internos, sistema nervoso, coração e vasos sanguíneos.

As causas são o contato sexual com uma pessoa infectada, transfusão de sangue contaminado, ou da mãe para o feto durante a gravidez. A bactéria *Treponema pallidum* é a responsável pela sífilis. O diagnóstico é feito por testes sanguíneos. O tratamento eficaz envolve antibióticos, geralmente penicilina. Prevenção inclui o uso de preservativos e exames regulares, especialmente em grupos de risco.

