

QUEILITE ACTÍNICA

Autor(res)

Rennan Luiz Oliveira Dos Santos
Adriano Gonçalves

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

Resumo

A queilite actínica é uma condição clínica inflamatória que afeta os lábios. Normalmente essa lesão ocorre após exposição excessiva e crônica aos raios ultravioletas. Como diagnóstico diferencial possui as lesões: carcinoma epidermóide, líquen plano, leucoplasia, eritroplasia e lúpus eritematosos.

Paciente do sexo masculino, 69 anos, leucoderma, trabalhador de zona rural, com diagnóstico de diabetes tipo I compensada, fumante e etilista por mais 20 anos, compareceu a clínica de odontologia da faculdade Anhanguera, campus Osasco, para realizar tratamento odontológico. No exame clínico extraoral foi observada perda da delimitação entre vermelhão do lábio inferior e a região cutânea com placas eritroleucoplásicas. As placas possuíam superfície lisa, limites nítidos e irregulares. A hipótese diagnóstica clínica foi queilite actínica. A conduta exercida foi a realização da biópsia incisional com remoção de fragmentos da região do lábio inferior confirmando a hipótese de queilite actínica. O paciente foi orientado a fazer uso de chapéu e filtro solar labial aplicando-o 2 a 3 vezes ao dia. Foi orientado retorno periódico a cada 6 meses.