



Iniciação
Científica
2023.2

06 à 08 de Dezembro de 2023
14h às 18h e das 16h às 22h


Anhanguera
São José - SP | Jardim Morumbi

FECHAMENTO DE DIASTEMAS EM DENTES ANTERIORES

Autor(res)

Cláudia Mara Miranda Russi
Flavia De Almeida Gomes Pereira

Categoria do Trabalho

1

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA

Introdução

A busca por um sorriso harmônico é o desejo da maior parte dos indivíduos, e manter sua integridade representa um grande desafio para os profissionais da odontologia. Qualquer alteração na aparência estética pode provocar implicações psicológicas que variam desde uma simples forma de disfarçar o problema até a introversão total do indivíduo, anulando sua desenvoltura social, e dessa forma reforçando a importância dos padrões estéticos para a sociedade. O objetivo dessa pesquisa é indicar quais técnicas e os materiais utilizados nos fechamentos de dentes anteriores, diminuir a entrada e acúmulo de alimentos e resíduos que, se não forem bem limpos, podem permanecer entre os dentes

Objetivo

O objetivo dessa pesquisa é indicar quais técnicas e os materiais utilizados nos fechamentos de dentes anteriores, diminuir a entrada e acúmulo de alimentos e resíduos que, se não forem bem limpos, podem permanecer entre os dentes.

Material e Métodos

Trata-se de um estudo qualitativo e descritivo do tipo revisão bibliográfica com coleta de dados a partir de fontes secundárias, por meio de levantamento bibliográfico para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas seguintes bases de dados: Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online (SCIELO) Foram utilizados para busca dos artigos as seguintes palavras-chaves e suas combinações nas Línguas portuguesa: "Atendimento em pacientes com diastemas", "Dentes anteriores com diastema", "Diastema".

Resultados e Discussão

Os diastemas dentários ocorrem frequentemente na população adulta, afetando em grande proporção o gênero feminino e pacientes asiáticos. Geralmente sua etiologia é de caráter multifatorial, podendo estar relacionada às anomalias dentárias de forma e tamanho, bem como pela discrepância dento alveolar de Bolton. No entanto, outros fatores também podem estar envolvidos no desenvolvimento dos diastemas, como as características hereditárias, hábitos deletérios, desequilíbrio muscular, migração dentária fisiológica ou patológica, agenesia dentária odontomas, cistos, fissuras palatinas, trespasse horizontal acentuado, defeitos na sutura intermaxilar e inserção do freio labial próximo a margem gengival. (SOUZA, 2022)



Para a correção dos diastemas, são indicados os tratamentos ortodônticos, facetas diretas em resina composta, facetas de porcelanas, lentes de contato, coroas cerâmicas, entre outros. (GUERRA, 2017)

Conclusão

Dentre as opções de tratamento para fechamento de diastemas, a técnica restauradora direta em resina composta representa um procedimento viável para a reabilitação da estética. Por se tratar de uma técnica relativamente simples, a reabilitação torna-se segura, previsível e totalmente reversível caso o paciente demonstre insatisfação no resultado clínico final. Entretanto, é imprescindível que o profissional tenha conhecimento técnico-científico, destreza manual, materiais restauradores etc

Referências

GUERRA, Micaela Lorena Raposo Seixas et al. Fechamento de diastemas anteriores com resina composta direta: relato de caso. FOL • Faculdade de Odontologia de Lins/Unimep, [S. l.], ano 2017, v. 27, n. 1, p. 63-68, 30 jun. 2017.

SOUZA, Fernanda Barbosa et al. Fechamento de diastema interincisivos: comparativo entre tratamento restaurador e ortodôntico. Revista Eletrônica Acervo Odontológico / Electronic Journal Dental Collection , [S. l.], ano 2022, v. 4, n. 1, p. 1-10, 30 set. 2022