Intoxicação pelo uso do tylenol

Autor(res)

Luiz Gustavo De Paiva Nunes
Beatriz Da Silva Gonçalves

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

CENTRO UNIVERSITÁRIO ANHANGUERA DE SÃO PAULO

Resumo

Os sintomas de intoxicação por Tylenol, cujo princípio ativo é o paracetamol, podem variar dependendo da quantidade ingerida e do tempo de exposição ao medicamento. Inicialmente, podem ocorrer náuseas, vômitos, perda de apetite e dor abdominal, que são sinais de alerta para uma possível superdosagem. À medida que a condição progride, o indivíduo pode experimentar sintomas mais graves, como dor no quadrante superior direito do abdômen, onde o fígado está localizado, e icterícia, que é o amarelamento da pele e dos olhos. Outros sintomas incluem confusão, letargia e, em casos extremos, colapso circulatório e insuficiência hepática aguda, que pode levar ao coma e à morte se não tratada prontamente.

A presença de acidose metabólica, hipoglicemia e coagulopatia também pode ser indicativa de toxicidade grave por paracetamol. É importante notar que a gravidade dos sintomas pode não refletir imediatamente a extensão do dano hepático, e os níveis de transaminases hepáticas podem aumentar 24 a 48 horas após a ingestão. Por isso, é crucial buscar atendimento médico imediato ao primeiro sinal de superdosagem, mesmo que os sintomas pareçam leves no início.

O tratamento precoce com acetilcisteína é fundamental para neutralizar os efeitos tóxicos do paracetamol e melhorar o prognóstico. A conscientização sobre os riscos associados ao uso inadequado de Tylenol e a importância de seguir as instruções de dosagem são essenciais para prevenir a intoxicação por paracetamol.