

**Autor(res)**

Flavia Thomazotti Claro
Debora Silva De Sousa Barbosa
Giullia Maria Da Silva Antevere
Marcello Goulart Tavares
Maria Thais Santos De Oliveira
Vania Da Silva Barbosa Martins

Categoria do Trabalho

1

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

Resumo

O câncer de colo do útero é causado pelo HPV e afeta mulheres, com sintomas como sangramento anormal e dor pélvica. O diagnóstico precoce é feito com o exame de Papanicolau. O tratamento inclui cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A prevenção envolve vacinação e uso de preservativos. A vacina tetravalente contra o HPV é recomendada para meninas e meninos de 9 a 14 anos. A OMS sugere estratégias para detecção precoce e tratamento das lesões pré-cancerosas, incluindo programas de rastreamento, acesso equitativo aos serviços de saúde e conscientização da população. Destaca-se a importância da vacinação contra o HPV e do tratamento adequado para lesões pré-cancerosas em mulheres.

O texto aborda a preocupação com o câncer de útero na Região das Américas, destacando a incidência e mortalidade, especialmente em países de baixa renda. Enfatiza a importância da vacinação contra o HPV e do tratamento oportuno de lesões pré-cancerosas na prevenção do câncer de útero. Ressalta as desigualdades no acesso aos serviços de detecção e tratamento na região, além das iniciativas da OMS e da OPAS para acelerar a eliminação do câncer de útero como problema de saúde pública. As diretrizes da OMS para triagem e tratamento seguem o método GRADE, com 19 recomendações e 10 pontos de boa prática. Buscam melhorar a prevenção, triagem e tratamento do câncer de colo do útero na América Latina e no Caribe, considerando as particularidades da região. As recomendações visam adaptar as estratégias de prevenção e tratamento para essas populações, contribuindo para saúde das mulheres na região.