

6ª SEMANA DE CONHECIMENTO



Câncer do colo do útero

Autor(res)

Flavia Thomazotti Claro
Debora Silva De Sousa Barbosa
Vania Da Silva Barbosa Martins
Giullia Maria Da Silva Antevere
Marcello Goulart Tavares
Maria Thais Santos De Oliveira

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

Resumo

O câncer de colo do útero é causado pelo HPV e afeta mulheres, com sintomas como sangramento anormal e dor pélvica. O diagnóstico precoce é feito com o exame de Papanicolaou. O tratamento inclui cirurgia, quimioterapia e radioterapia. A prevenção envolve vacinação e uso de preservativos. A vacina tetravalente contra o HPV é recomendada para meninas e meninos de 9 a 14 anos. A OMS sugere estratégias para detecção precoce e tratamento das lesões pré-cancerosas, incluindo programas de rastreamento, acesso equitativo aos serviços de saúde e conscientização da população. Destaca-se a importância da vacinação contra o HPV e do tratamento adequado para lesões pré-cancerosas em mulheres

O texto aborda a preocupação com o câncer de útero na Região das Américas, destacando a incidência e mortalidade, especialmente em países de baixa renda. Enfatiza a importância da vacinação contra o HPV e do tratamento oportuno de lesões pré-cancerosas na prevenção do câncer de útero. Ressalta as desigualdades no acesso aos serviços de detecção e tratamento na região, além das iniciativas da OMS e da OPAS para acelerar a eliminação do câncer de útero como problema de saúde pública. As diretrizes da OMS para triagem e tratamento seguem o método GRADE, com 19 recomendações e 10 pontos de boa prática. Buscam melhorar a prevenção, triagem e tratamento do câncer de colo do útero na América Latina e no Caribe, considerando as particularidades da região. As recomendações visam adaptar as estratégias de prevenção e tratamento para essas populações, contribuindo para saúde das mulheres na região.