Câncer infarto juvenil

Autor(res)

Flavia Thomazotti Claro
Julia Rosangela Gomes Do Nascimento
Julia Paiva Teixeira

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

Resumo

O pólipo juvenil colorretal foi descrito inicialmente por Verse. Essas lesões não neoplásicas são predominantes em crianças e bebês, sendo raras em crianças maiores, após os 14 anos de idade, e em adultos. Uma paciente de 75 anos foi submetida a uma colonoscopia, onde se observou um pólipo pedunculado no cólon transverso. Realizou-se a eletrorressecção endoscópica completa do pólipo, que foi enviado para análise histopatológica. Macroscopicamente, o pólipo apresentava formato arredondado irregular, medindo aproximadamente 2,5 x 2 x 1 cm, com superfície finamente granulada e avermelhada, e coloração vermelho escuro nos cortes seriados. O exame histológico revelou glândulas distribuídas irregularmente, algumas cisticamente dilatadas, todas revestidas com epitélio intestinal normal. A superfície do pólipo estava parcialmente erodida e substituída por tecido de granulação celular inespecífico, com sinais de infarto hemorrágico no estroma. As características histopatológicas correspondiam a um pólipo juvenil. Pólipos juvenis são extremamente raros em adultos, portanto, descrevemos o caso desta paciente septuagenária com pólipo juvenil no cólon transverso.