



Manifestações Oraís Associadas ao Uso de Próteses Removíveis

Autor(res)

Andréia Ferreira Do Carmo
Bianca Ferreira Macedo
Camila Vitória Da Silva Souza

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

FAMA MACAPÁ

Resumo

As próteses dentárias removíveis restabelecem a função e estética do sistema estomatognático, entretanto as consequências do uso inadequado e má higienização de próteses removíveis podem afetar a cavidade oral devido ao acúmulo de microrganismos ou advindas de uma má adaptação, gerando traumatismos sobre os rebordos alveolares e injúrias aos tecidos bucais. A etiologia do edentulismo ocorre principalmente devido a cárie, traumatismos e a doença periodontal, podendo estar correlacionada também às patologias sistêmicas, hábitos do paciente e anomalias como agenesias – unitárias a totais. O objetivo deste trabalho é estudar as principais manifestações orais associadas ao uso de próteses removíveis, identificando etiologia, características orais e formas de tratamento das lesões. Para isto, foi realizada uma revisão de literatura baseada em artigos científicos publicados nos últimos 10 anos disponíveis nas bases de dados Scielo e Google acadêmico, bem como em livros que abordassem sobre o tema. As lesões mais frequentes em pacientes que fazem uso de próteses removíveis são estomatite protética, queilite angular, úlceras traumáticas e hiperplasia fibrosa inflamatória, as quais podem ser evitadas com os ajustes adequados da prótese após a instalação, orientação correta do profissional ao paciente sobre a higienização e as visitas periódicas ao dentista. É importante que o cirurgião-dentista conheça as manifestações orais ocasionadas por próteses removíveis, saiba tratar, orientar e motivar o paciente a colaborar com o tratamento, bem como orientar o paciente a realizar o autoexame da boca, para que ao perceber qualquer alteração na boca, procure um profissional qualificado.