



Manifestações Oraís Associadas ao Uso de Próteses Removíveis

Autor(res)

Andréia Ferreira Do Carmo
Bianca Ferreira Macedo
Camila Vitória Da Silva Souza

Categoria do Trabalho

1

Instituição

FAMA MACAPÁ

Resumo

As próteses dentárias removíveis restabelecem a função e estética do sistema estomatognático, entretanto as consequências do uso inadequado e má higienização de próteses removíveis podem afetar a cavidade oral devido ao acúmulo de microrganismos ou advindas de uma má adaptação, gerando traumatismos sobre os rebordos alveolares e injúrias aos tecidos bucais. A etiologia do edentulismo ocorre principalmente devido a cárie, traumatismos e a doença periodontal, podendo estar correlacionada também às patologias sistêmicas, hábitos do paciente e anomalias como agenesias – unitárias a totais. O objetivo deste trabalho é estudar as principais manifestações orais associadas ao uso de próteses removíveis, identificando etiologia, características orais e formas de tratamento das lesões. Para isto, foi realizada uma revisão de literatura baseada em artigos científicos publicados nos últimos 10 anos disponíveis nas bases de dados Scielo e Google acadêmico, bem como em livros que abordassem sobre o tema. As lesões mais frequentes em pacientes que fazem uso de próteses removíveis são estomatite protética, queilite angular, úlceras traumáticas e hiperplasia fibrosa inflamatória, as quais podem ser evitadas com os ajustes adequados da prótese após a instalação, orientação correta do profissional ao paciente sobre a higienização e as visitas periódicas ao dentista. É importante que o cirurgião-dentista conheça as manifestações orais ocasionadas por próteses removíveis, saiba tratar, orientar e motivar o paciente a colaborar com o tratamento, bem como orientar o paciente a realizar o autoexame da boca, para que ao perceber qualquer alteração na boca, procure um profissional qualificado.