



## 7ª SEMANA DE CONHECIMENTO



### Sífilis: Infecção Sexualmente Transmissível (IST)

28/10 a 01/11



#### Autor(res)

Lenir Honorio Soares  
Vitória Teixeira Borges  
Liz Roxana Duarte Ramírez  
Márcia Rodrigues Macedo  
Jucileia Correa De Oliveira  
Rafaela Costa Matos  
Elma Dos Santos Ferreira  
Bianca Carneiro Figueiredo

#### Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

#### Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

#### Resumo

**Introdução:**A sífilis é uma IST, causada pela bactéria *Treponema Pallidum* é uma doença curável e exclusiva do ser humano. Pode apresentar diversas manifestações clínicas e diferentes fases (sífilis primária, secundária, terciária e latente), tendo maior possibilidade de transmissão nas fases primária e secundária. Pode ser transmitida por relação sexual e para feto durante a gestação ou na hora do parto.**Objetivo:**Apresentar o conceito da patologia, descrever os métodos de prevenção e tratamento da doença.**Metodologia:**O presente estudo tratou-se de uma revisão bibliográfica, utilizando uma janela cronológica dos últimos 10 anos.**Resultados/Discussão:**estágios da doença:**Sífilis primária:** surgem feridas, geralmente únicas, no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros locais da pele), que aparece entre 10 e 90 dias após o contágio. Normalmente, ela não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhada de ínguas (caroços) na virilha; Essa ferida desaparece sozinha, independentemente de tratamento. **Sífilis secundária:** os sinais e sintomas aparecem entre seis semanas e seis meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Podem surgir manchas no corpo, que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés. Essas lesões são ricas em bactérias. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo. As manchas desaparecem em algumas semanas, independentemente de tratamento, trazendo a falsa impressão de cura.**Sífilis terciária:** Pode surgir entre 1 e 40 anos após o início da infecção.Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte.**Diagnóstico/Tratamento:**A sífilis é diagnosticada pelo teste rápido ( exame que detecta anticorpos antitreponêmicos no sangue) realizado na UBS complementado pelo VDRL e o FTA-ABS. O tratamento é realizado com antibiótico ( Penicilina Benzatina- benzetacil).**Prevenção:** Uso correto e regular de preservativo masculina ou feminina durante todas as relações sexuais, incluindo o sexo oral. Realizar testes rápidos regularmente. **Conclusão:** Conclui-se que os testes rápidos estão disponíveis no SUS, e o quanto antes o diagnóstico for feito, mais fácil o tratamento e mais leves serão as lesões. Na gestação o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível. É necessário o uso de preservativos em todas as relações sexuais para a

prevenção.



7ª SEMANA DE  
**CONHECIMENTO**



28/10 a 01/11

