



# 7ª SEMANA DE CONHECIMENTO

Anhanguera

Sífilis: Infecção Sexualmente Transmissível (IST)

28/10 a 01/11



## Autor(es)

Lenir Honorio Soares  
Vitória Teixeira Borges  
Jucileia Correa De Oliveira  
Liz Roxana Duarte Ramírez  
Bianca Carneiro Figueiredo  
Elma Dos Santos Ferreira  
Rafaela Costa Matos  
Márcia Rodrigues Macedo

## Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

## Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

## Resumo

**Introdução:** A sífilis é uma IST, causada pela bactéria *Treponema Pallidum* é uma doença curável e exclusiva do ser humano. Pode apresentar diversas manifestações clínicas e diferentes fases (sífilis primária, secundária, terciária e latente), tendo maior possibilidade de transmissão nas fases primária e secundária. Pode ser transmitida por relação sexual e para feto durante a gestação ou na hora do parto.

**Objetivo:** Apresentar o conceito da patologia, descrever os métodos de prevenção e tratamento da doença.

**Metodologia:** O presente estudo tratou-se de uma revisão bibliográfica, utilizando uma janela cronológica dos últimos 10 anos.

**Resultados/Discussão:** estágios da doença:  
**Sífilis primária:** surgem feridas, geralmente únicas, no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca, ou outros locais da pele), que aparece entre 10 e 90 dias após o contágio. Normalmente, ela não dói, não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhada de ínguas (caroços) na virilha; Essa ferida desaparece sozinha, independentemente de tratamento.

**Sífilis secundária:** os sinais e sintomas aparecem entre seis semanas e seis meses do aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Podem surgir manchas no corpo, que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés. Essas lesões são ricas em bactérias. Pode ocorrer febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo. As manchas desaparecem em algumas semanas, independentemente de tratamento, trazendo a falsa impressão de cura.

**Sífilis terciária:** Pode surgir entre 1 e 40 anos após o início da infecção. Costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte.

**Diagnóstico/Tratamento:** A sífilis é diagnosticada pelo teste rápido (exame que detecta anticorpos antitreponêmicos no sangue) realizado na UBS complementado pelo VDRL e o FTA-ABS. O tratamento é realizado com antibiótico (Penicilina Benzatina- benzetacil).

**Prevenção:** Uso correto e regular de preservativo masculina ou feminina durante todas as relações sexuais, incluindo o sexo oral. Realizar testes rápidos regularmente.

**Conclusão:** Conclui-se que os testes rápidos estão disponíveis no SUS, e quanto antes o diagnóstico for feito, mais fácil o tratamento e mais leves serão as lesões. Na gestação o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível. É necessário o uso de preservativos em todas as relações sexuais para a

prevenção.



# 7<sup>a</sup> SEMANA DE CONHECIMENTO



28/10 a 01/11

