

# CARACTERÍSTICAS DA DENTIÇÃO MISTA

## Autor(res)

Lígia Bio Razori Da Silva Vitória Mulinari Viel Ferro Carleusa Da Silva Lima Caio Luiz De Souza Patrícia Santana Santos Gisleide Da Silva Dos Passos Allan Marinho Gasparini Magri Giovanna Millene De Oliveira.

### Categoria do Trabalho

1

#### Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

#### Resumo

A dentição mista começa, aos seis anos. Nessa época, os dentes de leite começam a cair, e os permanentes começam a nascer. A criança passa, a ter os dois tipos de dente na boca. O período da dentição acontece até os 12 anos, quando os dentes de leite terminam de cair. É normal que ocorra uma falta de espaço para que os incisivos permanentes apareçam bem alinhados na boca.

Durante o período de dentição mista, o arco dentário apresenta uma série de mudanças. A maior mudança na oclusão ocorre antes ou imediatamente após a erupção dos molares permanentes .

O desenvolvimento da mordida está caracterizado por mudanças contínuas na sua estrutura e na posição dos dentes durante o crescimemento do indivíduo até a idade adulta. Pode occorer mudanças na posição de um único dente, na forma, no tamanho do arco dentário e na oclusão dos dentes.

Após a erupção dos incisivos permanente, há expansão dos arcos dentários na região anterior, devido ao crescimento frontal e lateral do osso alvelar.

O aumento em largura do arco dentário, te dá distância intercanina, antes e durante a troca dos dentes anteriores. Esse aumento é mais ou menos 3 mm.

O crescimento esquelético é o fator mais importante no ajuste oclusal ântero-posterior na dentição mista.