

CARACTERÍSTICAS DA DENTIÇÃO MISTA

Autor(res)

Lígia Bio Razori Da Silva
Vitória Mulinari Viel Ferro
Patrícia Santana Santos
Gisleide Da Silva Dos Passos
Carleusa Da Silva Lima
Caio Luiz De Souza
Allan Marinho Gasparini Magri
Giovanna Millene De Oliveira.

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

Resumo

A dentição mista começa, aos seis anos. Nessa época, os dentes de leite começam a cair, e os permanentes começam a nascer. A criança passa, a ter os dois tipos de dente na boca. O período da dentição acontece até os 12 anos, quando os dentes de leite terminam de cair. É normal que ocorra uma falta de espaço para que os incisivos permanentes apareçam bem alinhados na boca.

Durante o período de dentição mista, o arco dentário apresenta uma série de mudanças. A maior mudança na oclusão ocorre antes ou imediatamente após a erupção dos molares permanentes .

O desenvolvimento da mordida está caracterizado por mudanças contínuas na sua estrutura e na posição dos dentes durante o crescimento do indivíduo até a idade adulta. Pode ocorrer mudanças na posição de um único dente, na forma, no tamanho do arco dentário e na oclusão dos dentes.

Após a erupção dos incisivos permanente, há expansão dos arcos dentários na região anterior, devido ao crescimento frontal e lateral do osso alveolar.

O aumento em largura do arco dentário, te dá distância intercanina, antes e durante a troca dos dentes anteriores. Esse aumento é mais ou menos 3 mm.

O crescimento esquelético é o fator mais importante no ajuste oclusal ântero-posterior na dentição mista.