

ESTÉTICA EM IMPLANTODONTIA: REVISÃO NARRATIVA DOS FATORES DETERMINANTES PARA RESULTADOS PREVISÍVEIS

Autor(res)

Otto Henrique Dos Santos Coutinho Favacho
Gustavo Adolfo Dos Santos Coutinho Favacho

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE GUARULHOS

Introdução

A estética tornou-se parâmetro fundamental na definição de sucesso em reabilitações implantossuportadas, especialmente na região anterior da maxila. O posicionamento tridimensional do implante, as dimensões dos tecidos peri-implantares e o perfil de emergência da restauração constituem fatores críticos que influenciam diretamente o resultado estético final. A crescente demanda por excelência estética exige conhecimento aprofundado dos princípios biológicos, cirúrgicos e protéticos envolvidos na terapia com implantes. A espessura do tecido mole, posição da junção mucogengival e tipo de conexão do implante também influenciam o resultado estético.

Objetivo

Revisar a literatura científica sobre os principais fatores que influenciam os resultados estéticos em implantodontia, identificando parâmetros críticos e estratégias clínicas para obtenção de desfechos previsíveis.

Material e Métodos

Realizou-se revisão narrativa da literatura nas bases de dados PubMed, Web of Science e Cochrane, utilizando os descritores "dental implant esthetics", "peri-implant soft tissue" e "implant positioning". Foram selecionados artigos publicados entre 2014 e 2025, incluindo ensaios clínicos, revisões sistemáticas e estudos de coorte que abordassem aspectos estéticos em implantodontia. A seleção dos estudos considerou relevância metodológica, clareza dos critérios de inclusão e aplicabilidade clínica dos resultados, priorizando evidências relacionadas ao posicionamento tridimensional do implante, manejo dos tecidos peri-implantares e estabilidade estética a longo prazo.

Resultados e Discussão

A literatura evidencia que o posicionamento tridimensional do implante, respeitando distâncias mínimas de 3 mm entre implantes adjacentes e 1,5 mm das raízes dentárias, constitui fator determinante para manutenção das papilas interdentais e altura da mucosa vestibular. O fenótipo peri-implantar, incluindo espessura de tecido mole (2 mm) e volume ósseo vestibular, correlaciona-se diretamente com estabilidade estética a longo prazo. O perfil de

emergência adequado, obtido através de provisionalização criteriosa, permite condicionamento tecidual favorável. Índices estéticos validados, como Pink Esthetic Score (PES), demonstram confiabilidade na avaliação objetiva dos resultados.

Conclusão

A previsibilidade estética em implantodontia depende da integração de múltiplos fatores: diagnóstico preciso, posicionamento tridimensional correto do implante, manejo adequado dos tecidos duros e moles, e planejamento protético criterioso. O conhecimento aprofundado destes parâmetros permite ao clínico alcançar resultados estéticos superiores e duradouros.

Referências

- Belser UC, Grütter L, Vailati F, Bornstein MM, Weber HP, Buser D. Outcome evaluation of early placed maxillary anterior single-tooth implants using objective esthetic criteria: PES/WES. J Periodontol. 2009;80(1):140-51.
- Buser D, Martin W, Belser UC. Optimizing esthetics for implant restorations in the anterior maxilla. Periodontol 2000. 2004;34:79-89.
- Chen ST, Buser D. Clinical and esthetic outcomes of implants placed in the anterior maxilla. Int J Oral Maxillofac Implants. 2014;29(Suppl):186-215.