GASTRITE HELICOBACTER PYLORI (H.PYLORI)

Autor(res)

Maiara Jurema Soares
Yasmin Pereira Da Silva
Geovanna Cesar Pereira Souza
Samara Santos De Oliveira
Livya Da Silva Rodrigues
Nathalia Marques
Rosimeire Da Silva
Bianca Ferreira Dos Santos
Brenda Barbalho Campos

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

Resumo

A Helicobacter pylori, mais conhecida como H.pylori, é uma bactéria que vive no nosso estômago e duodeno, sendo responsável pela infecção bacteriana crônica mais comum em seres humanos, presente em todas as populações e em indivíduos de todas as idades.
Praticamente todas as pessoas com infecção pelo H.pylori apresentam gastrite, que pode afetar todo o estômago. Às vezes, a infecção pode causar gastrite erosiva e até mesmo uma úlcera no estômago.
A predominância da gastrite está associada à colonização pela bactériaH.pylori. A infecção pela bactériaé uma das mais prevalentes entre os seres humanos. Estima-se que afete cerca de metade da população mundial, e no Brasil, a prevalência é de aproximadamente 60%.
Infecção pelo H.pylori nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento é muito alta, atingindo cerca de 50% das crianças (5 anos de idade) e acima de 70% (10 anos de idade). A infecção é adquirida pela ingestão da bactéria e transmitida principalmente dentro das famílias. A principal fonte de transmissão dentro da família é a mãe. A prevalência da H.pylori está fortemente correlacionada com as condições socioeconômicas. Fatores como a alta densidade de habitantes no lar e falta de água corrente tem sido vinculada a uma maior aquisição de infecção pela H.pylori.
A prevalência da infecção por H.pylori aumenta com a idade e é praticamente igual em homens e mulheres.
O tratamento padrão para esse tipo de diagnóstico consiste na combinação de 3 a 4 medicamentos.
O tratamento é composto pela prevenção e pelo tratamento clínico feito através de fármacos de diversas dosagens.
Para que o paciente tenha um maior aproveito e uma porcentagem boa do fármaco ingerido, é necessário que tome algumas precauções e fique atento com as interações fármaco-nutriente que acontece ao tomar a medicação.
Poranto podemos concluir que os principais fármacos para o tratamento da bactéria H.pylore, são, Amoxilina que

reduz a biodisponibilidade de vitaminas do complexo B, sendo assim tem que ser tomados com água, leite ou suco para não reduzir o efeito do fármaco já o Omeprazol diminui a absorção de ferro e vitamina B12, ou seja, tem que ser ingerido em jejum de 30 minutos antes do café da manhã e a Claritromicina diminui a biodisponibilidade de vitaminas do complexo B e pode se ingerido com alimento porque reduz efeitos gastrointestinais e aumentam a absorção de suspensão oral.