Sensibilidade Dental Após Clareamento Dental

Autor(res)

Talita Zanluqui De Souza
Caio Luiz De Souza

Categoria do Trabalho

3

Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

Resumo

Atualmente ter um sorriso mais branco e também mais alinhado é o desejo de muitas pessoas, por trazer uma aparência muito mais moderna e harmônica, sendo assim, a odontologia relacionada a estética desenvolveu durante algumas décadas um procedimento ao qual veio a satisfazer o paciente com o resultado de dentes mais brancos, que é o procedimento de clareamento dental.
O tratamento para clareamento dental pode ser realizado através de algumas técnicas: o clareamento caseiro, que é realizado com moldeiras individuais e géis a base de peróxidos em uma concentração mais baixas variando de 10% a 20% e o clareamento em consultório, onde é utilizado peróxidos em concentrações mais altas de 35%.
A sensibilidade após o clareamento pode ocorrer por alguns fatores como a alta concentração do gel utilizado e também o tempo de contato com o agente clareador, pois o gel ele penetra na camada superficial do dente em esmalte em seguida ele vai migrar para as bordas da dentina ela é uma porção mais interna do dente e ela abriga as terminações nervosas.
Sendo assim, para obter bons resultados esperados com a prática clareadora e reduzir o fator da sensibilidade dental ao agente clareador, é necessário que o cirurgião-dentista sempre busque conhecimento sobre os produtos, concentrações e suas técnicas clareadoras, para que o paciente venha a ter o mínimo de sensibilidade possível no clareamento dental