

## Candidíase eritematosa causada por prótese removível mal adaptada

### Autor(res)

Talita Zanluqui De Souza  
Carleusa Da Silva Lima

### Categoria do Trabalho

3

### Instituição

FACULDADE ANHANGUERA DE OSASCO

### Resumo

O uso da prótese dentária está diretamente ligada ao envelhecimento da população, tendo em vista substituir um ou mais dentes ou tecido de sustentação e proteção ausente na cavidade oral, sendo uma das reabilitações mais acessíveis ao paciente, podendo ser fixa ou removível, parciais ou totais, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Tendo com objetivo restaurar e manter a função mastigatória, neuromuscular, fonética, bem-estar físico, mental e social do paciente.

A instalação de uma prótese dentária removível provoca uma alteração quantitativa e qualitativa da placa bacteriana, aumentando deste modo os processos inflamatórios da cavidade bucal (FONSECA et al., 2007). Visto posto, cabe ao profissional cirurgião dentista orientar o usuário sobre os cuidados necessários para o uso da mesma.

A Candidíase é a infecção micótica mais comum da boca (Scully, 1992; Sonis et al, 1996; Castro, 2000; Regezi & Sciubba, 2000), principalmente em próteses mal adaptadas. As lesões na cavidade oral geralmente estão associadas a irritação local, logo, cabe ao cirurgião dentista executar um planejamento e confecção protética adequada para o paciente, visando evitar danos em tecidos associados a reabilitação.