

## Extração de siso preventiva

### Autor(res)

Talita Zanluqui De Souza  
Victor Aristides Alves

### Categoria do Trabalho

3

### Instituição

FACULDADE ANHANGUERA

### Resumo

A indicação da exodontia preventiva tem gerado atrito entre os profissionais especialistas da Odontologia ,pois deve-se saber indicar esse procedimento e essa indicação depende de vários fatores , desde o paciente apresentar sintomatologia dolorosa ou não na região do siso até um possível apinhamento ou infecções ,e estes fatores geram diferentes opiniões entre os especialistas , principalmente entre ortodontistas e cirurgiões bucomaxilos , fica evidente que os bucomaxilos indicam mais as extrações de sisos do que os ortodontistas afim de evitar apinhamento ,porém ,ao indicar tal , o cirurgião dentista deve estar ciente dos riscos e benefícios e apresenta-los , devendo sempre considerar as complicações cirurgicas e pós cirurgicas desse procedimento , pode-se citar hemorragia , comunicação buco sinusal, alveolite , dor , edema , parestesia , abscesso e até mesmo em casos mais raros apresentarem fratura dos maxilares, a recuperação pós operatoria dependerá de vários fatores como a saúde em geral do paciente que vai influenciar diretamente no processo de cicatrização , experiência do profissional que realizou a cirurgia , higiene oral e disciplina com as medicações prescritas pelo cirurgião dentista .

Além de precisar saber indicar , o cirurgião dentista deve apresentar meios que considerem planos de tratamento futuros com abordagens multidisciplinares , seja elas abordagens cirurgicas ou ortodonticas , deve apresentar uma relação custo-benefício ao paciente que justifique a cirurgia ou não cirurgia de terceiros molares de maneira profilática , existem casos em que essa cirurgia não é indicada , como em casos em que os dentes do siso não comprometem a arcada dentária causando apinhamentos , nem causem dor ou desconforto ao paciente , porém em casos em que o paciente apresente processos patológicos como pericoronarite , cistos odontogênicos , reabsorções radiculares , caries na distal dos segundos molares , dor , trismo , edema , apinhamento, o procedimento é indicado.

Por fim , mais importante do que saber ou não indicar o procedimento , é sempre manter o compromisso de fazer o bem e se preocupar com o bem-estar do paciente , sendo assim , deve-se analisar minuciosamente se o procedimento de exodontia dos terceiros molares de maneira preventiva trará mais benefícios ou malefícios ao paciente.