Sensibilidade odontológica após o clareamento dental

Autor(res)

Talita Zanluqui De Souza
Patrícia Santana Santos

Categoria do Trabalho

Trabalho Acadêmico

Instituição

UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE OSASCO

Resumo

Os tratamentos estéticos odontológicos têm abrangido um grupo cada vez mais amplo de pacientes interessados em melhorar o alinhamento, a oclusão e, nesta ocasião, o clareamento dentário. Diante do exposto, questiona-se por qual motivo ocorre a sensibilidade dental após clareamento em consultório? O objetivo geral do presente artigo é compreender como tratar a sensibilidade dental após clareamento em consultório. De maneira específica, pretende-se descrever os elementos do clareamento dental; compreender a sensibilidade dental após clareamento em consultório; demonstrar formas de minimização desta sensibilidade e tratamento. A metodologia utilizada neste trabalho é a Revisão de Literatura, através da pesquisa acadêmica em livros, artigos e afins sobre o tema em comento, com a busca nas bases de dados (livros, sites de banco de dados), em especial Scielo, Lilacs, Google Acadêmico. Através da revisão bibliográfica exposta nos resultados e discussão, foi possível concluir que a sensibilidade dentária geralmente dura alguns dias após um tratamento de clareamento. A melhor maneira de obter um sorriso brilhante com o mínimo de sensibilidade dentária é fazer um tratamento profissional de clareamento. A hipersensibilidade dentinária é comum entre os pacientes de clareamento dental. A condição causa sensibilidade aumentada em resposta a estímulos como bebidas quentes e frias, certos alimentos doces e contato com os dentes (especialmente durante a escovação dos dentes).